EMYS LUTARIA, *young.*

J.V.C. Sowerby del. E. Lear lithog.

Printed by C. Hullmandel.

EMYS LUTARIA, *Lacep.*

Olivacea; collo pedibusque luteo striatis; testâ ovatâ, depressâ, subcarinatâ; sterno anticè truncato, posticè trigono-emarginato; capite suprà plano, laminâ unicâ glabrâ tecto; caudâ longâ, gracili, acutâ.

Testudo lutaria. Linn. Syst. Nat. (?)—Lacep. Quad. Ovip. t. iii. f. 1.
Emys lutaria. Schweig. Prod. sp. 18.—Merrem, var. β. γ. Amph. 25.
Testudo caspica. S. G. Gmel., Reise durch Russ. T. iii. S. 59. t. 10. 11.—Gmel. Syst. Nat. 1041.—Daud. Rept. ii. p. 124.—Schneid. Schildkr. p. 344.—Shaw, Gen. Zool. iii. p. 63.
Emys caspica. Schweig. Prod. sp. 21.
Clemmys caspica. Wagler, Icon. et Descr. Amph. f. ii. t. xxiv.
Emys vulgaris. Gray, Syn. p. 24.

Habitat in Hispaniâ (*Wagler*), in Asiâ occidentali, in Africâ boreali.
Mus. nostr.—Mus. Brit. &c.

Descriptio. *Caput* humile, planum, collo paulò latius, pyramidale, pileo laminâ unicâ, glabrâ tecto, olivaceum, ad latera et subtùs flavo vel luteo striatum. *Oculi* lutei, lineâ transversâ, nigrâ dimidiati. *Maxillæ* integræ, acutæ. *Collum* depressiusculum, cute laxâ, granulosâ tectum, olivaceo-fuscum, lineis longitudinalibus luteis, infrà pallidius, et in nonnullis flavescens. *Pedes* robusti, compressiusculi, cute rugulosâ et anticè squamosâ tecti, olivacei, flavo lineati. *Digiti* suprà squamosi. *Ungues* compressi, acuti, subtùs excavati. *Cauda* longa, gracilis, ad basin crassa, apicem versus sensim attenuata, acuta, ruguloso-granosa, olivacea, flavo obscurè lineati. *Testa* ovata, humilis, margine integerrimo; in animali adulto olivacea, suprà obsoletè carinata; in juniori viridi-olivacea, rufo et luteo variegata, et ruguloso-tricarinata. *Scuta dorsalia* in adulto glabra, in pullo rugosa: *vertebralia* paulò elevata; primum pentagonum, medio elevatiusculum; secundum et tertium ferè plana, hexagona,